

FELIWAY

フェリウェイ

【成分】


F3 猫フェイシャルフェロモン類縁化合物・・・10%

エタノール(90%)・・・77.6%

その他不活性成分・・・75ml まで

【特性】

この革新的で特許(米国特許 5 709 863)取得済みの本製品は猫のフェイシャルフェロモン(顔から分泌されるフェロモン)の一部と同じような性質があります。フェロモンとは動物が分泌する化学物質で縄張りを確認したり、ほかの個体とのコミュニケーションに使われる物質です。フェイシャルフェロモンは猫が周囲の環境に馴染み居心地を良くするために分泌されます。このフェロモンでマーキングされた場所を猫は馴染みのある快適な場所であると認識します。フェイシャルフェロモンは猫が顔の側面を物にこすりつけることにより付けられます。(図1参照)そして、フェイシャルフェロモンには猫の尿マーキングを抑制する働きがあります。




1. Facial marking

猫が尿マーキングを行うときは図2のような体勢をとります。

猫は以下のような一連の動作で尿マーキングをします。

- ・ 垂直な面を選び
- ・ 地面を搔き
- ・ お尻を対象の面に向け
- ・ 四肢で立ったまま尾を垂直に立て
- ・ 対象の面に向かい勢いよく尿を噴射します



2. Urine marking

以下のような時によく尿マーキングが行われます。

- ・ 発情期
- ・ 環境の変化(新たな人やペットの移住、新しい家具などの物が加わったり、ひっこしたり、長旅に連れて行かれたり)と猫がストレスを感じるような出来事を含む)

このような尿マーキングは地面から 20cm の高さに付けられ、尿の量がごく少量でも強烈な臭いを残します。

【目的】

猫の尿マーキングや引っ搔きを抑制または止めさせるために使用します。

新しい環境やストレスの多い環境(カゴ、乗り物、新居など)で猫を落ち着かせるために使用します。


その他の特定の使用目的については獣医師にご相談ください。

【使用目的】

動物にフェリウェイを直接吹き付けしないでください！！

(1) 尿マーキングを止めさせたい場合

すでに尿マーキングをされている場合や猫が尿マーキングしそうな場所(図3参照)に直接フェリウェイを吹きかけてください。ボトルを地面から垂直にし、吹き付けたい場所から 10cm ほど離しノズルを押してください。地面から 20cm ほどの高さが適切です。1 日 1 回のスプレーを猫が自分の顔の側面をその場所にこすりつけ、図 1 のようにフェイシャルマーキングをするまで続けてください。フェイシャルマーキングが見られないようなら 1 ヶ月ほど 1 日 1 回のスプレーを続けてください。以下のような状況では使用方法を変えてください。



3. Examples of prominent objects

・発情期の猫に使用する場合

オス猫が発情期のメス猫への反応して尿マーキングしているのであれば、すべての尿マーキングしそうな場所にフェリウェイを使用する必要はありません。たいていはドアや窓付近の尿マーキングされた場所だけで十分です。

・複数の猫を飼っている場合

多くの猫がいると尿マーキングされる危険が多くなるので、すでに尿マーキングされた場所には 1 日に 2~3 回、今後されそうな場所には 1 日に 1 回フェリウェイをご使用下さい。拡散タイプのフェリウェイ リキッドはこのような複数の猫を飼育されている場合に最適です。

・老齢猫の場合

複数の猫がいる場合と同様の方法で 45 日間程必要になるかもしれません。その後は必要な限り 2~3 日に 1 回の間隔でスプレーをご使用下さい。

【重要事項】

各種の洗剤や消毒剤の使用は猫による尿マーキングの可能性を高めます。すでに尿マーキングされた場所を漂白剤や合成洗剤由来の洗剤を使用しないでください。

(2) 尿マーキングを未然に防ぎたい場合

新居や乗り物で尿マーキングを未然に防ぎたいときは尿マーキングされそうな場所に 1 日 1 回フェリウェイを吹き付けてください。(図3参照) 対象の床から 20cm の高さの所にボトルを 10cm 離れたところから吹き付けてください。

(3) 猫を新しい環境に慣れさせたい場合

カゴでの移動の場合は猫を入れる 20 分前にフェリウェイをカゴの内部に吹き付けてください。車などの乗り物で移動する場合は猫を入れる前に猫のくつろげる場所に 3~4 回吹き付けてください。猫を一時預ける場合は猫の宿泊設備に猫を入れる前にそれぞれの隅に吹き付け、猫が顔をすりつけフェイシャルマーキングをし始めるまで 1 日 1 回繰り返してください。

(4) 猫の引っ掻きを未然に防ぎたい場合

引っ掻く動作も自分の縄張りを示すマーキングの一種です。尿マーキングのように、引っ掻く動作もまた視覚的なマーキングでありフェロモンを含んだマーキングでもあります。このフェロモンは手足の肉趾から分泌されます。1 日 1 回引っかかれそうな場所に吹きかけてください。床から 20cm の高さに吹きかける面から 10cm 離し面全体にかかるように数回吹き付けてください。

【注意事項】

- ・本来、本品により染みや汚れが残ることはありませんが、家具などの材質により跡が残ることがあるかもしれません。本品の使用前に目立たない部分でテストすることをお勧めします。
- ・本品を効果的に使うには使用する一時間前から室内に放置し室温に戻してからご使用下さい。
- ・振ってからお使い下さい。
- ・引火しやすいので火気には近づけないでください。
- ・刺激性があるので目や肺に入らないようにしてください。
- ・キャップはきつく締めて子供の手の届かないところに室温で保管してください。
- ・スプレーを使うときは縦にしてご使用下さい。
- ・より詳しい情報は www.feliway.com でご覧いただけます。

【内容量】

75ml

フランス製

米国での販売：

Ceva Animal Health Inc.
8901 Rosehill Road
Lenexa, KS 66215 – USA

www.ceva.com

FELIWAY は Ceva Santé Animale の登録商標です。

米国特許 5 709 863

以上はフェリウェイに付属の英文取扱説明書の翻訳です。

文中の図は英文取扱説明書に掲載されている物を使用しています。

以前ビルバックが日本で販売していた Ceva Santé Animale のフェリウェイに付属していた取扱説明書には重要な翻訳間違いが有るようです。（使用目的（1）の老齢猫を参照）お気を付け下さい。